

<h3>Recién nacido</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b>BCG (1)</b> Única dosis (A)</li> <li>+ <b>Hepatitis B</b> Dosis Neonatal (B)</li> </ul>	<h3>2 Meses</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b>Neumococo Conjugada (2)</b> 1º dosis</li> <li>+ <b>Quíntuple o Pentavalente (3)</b> 1º dosis</li> <li>+ <b>IPV (4)</b> 1º dosis</li> <li>+ <b>Rotavirus (D)</b> 1º dosis</li> </ul>	<h3>3 Meses</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b>Meningococo ACYW</b> 1º dosis</li> </ul>	<h3>4 Meses</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b>Neumococo Conjugada (2)</b> 2º dosis</li> <li>+ <b>Quíntuple o Pentavalente (3)</b> 2º dosis</li> <li>+ <b>IPV (4)</b> 2º dosis</li> <li>+ <b>Rotavirus</b> 2º dosis (E)</li> </ul>	<h3>5 meses</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b>Meningococo ACYW</b> 2º dosis</li> </ul>	<h3>6 meses</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b>Quíntuple o Pentavalente (3)</b> 3º dosis</li> <li>+ <b>IPV (4)</b> 3º dosis</li> <li>+ <b>Antigripal</b> Dosis anual (F)</li> </ul>
<h3>12 meses</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b>Neumococo Conjugada (2)</b> Refuerzo</li> <li>+ <b>Antigripal</b> Dosis Anual (F)</li> <li>+ <b>Hepatitis A</b> Única dosis</li> <li>+ <b>Triple Viral (5)</b> 1º dosis</li> </ul>	<h3>15 meses</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b>Quíntuple o Pentavalente (3)</b> 1º Refuerzo</li> <li>+ <b>Meningococo ACYW</b> Refuerzo</li> <li>+ <b>Antigripal</b> Dosis anual (F)</li> <li>+ <b>Triple Viral (5)</b> 2º dosis</li> </ul>	<h3>18 meses</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b>Quíntuple o Pentavalente (3)</b> 1º Refuerzo</li> <li>+ <b>Antigripal</b> Dosis anual (F)</li> <li>+ <b>Triple viral</b> 2º dosis</li> <li>+ <b>(*)Fiebre amarilla</b> 1º dosis (P)</li> </ul>	<h3>5 años</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b>IPV</b> Refuerzo</li> <li>+ <b>Triple viral (5)</b> Nacidos 2021/22/23/24 (J)</li> <li>+ <b>Varicela</b> 2º dosis</li> <li>+ <b>Triple Bacteriana Celular (6)</b> 2º Refuerzo</li> </ul>	<h3>11 años</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b>Hepatitis B</b> Iniciar o completar esquema (C)</li> <li>+ <b>Meningococo ACYW</b> Única dosis</li> <li>+ <b>Triple viral (5)</b> Iniciar o completar esquema (K)</li> <li>+ <b>Triple Bacteriana Acelular (7)</b> Refuerzo</li> <li>+ <b>Virus Papiloma Humano</b> Única dosis (N)</li> <li>+ <b>(*)Fiebre Amarilla</b> Refuerzo (Q)</li> </ul>	<h3>A partir de los 15 años</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b>Hepatitis B</b> Iniciar o completar esquema (C)</li> <li>+ <b>Triple Viral (5)</b> Iniciar o completar esquema (K)</li> <li>+ <b>Fiebre Hemorrágica Argentina</b> Única dosis (R)</li> </ul>
<h3>Adultos</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b>Hepatitis B</b> Iniciar o completar esquema (C)</li> <li>+ <b>Neumococo Conjugada (2)</b> Única dosis (G)</li> <li>+ <b>Antigripal</b> Única dosis (G)</li> <li>+ <b>Triple viral (5)</b> Iniciar o completar esquema (K)</li> <li>+ <b>Doble Bacteriana (8)</b> Refuerzo cada 10 años</li> <li>+ <b>Fiebre Hemorrágica Argentina</b> Única dosis (R)</li> </ul>	<h3>Embarazadas</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b>Hepatitis B</b> Iniciar o completar esquema (C)</li> <li>+ <b>Antigripal</b> Una dosis (H)</li> <li>+ <b>Triple Bacteriana Acelular (7)</b> Una dosis (L)</li> <li>+ <b>Virus Sincicial Respiratorio (9)</b> Única dosis (O)</li> </ul>	<h3>Puérperas</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b>Hepatitis B</b> Iniciar o completar esquema (C)</li> <li>+ <b>Antigripal</b> Una dosis (I)</li> <li>+ <b>Triple viral (5)</b> Iniciar o completar esquema (K)</li> </ul>	<h3>Personal de salud</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b>Hepatitis B</b> Iniciar o completar esquema (C)</li> <li>+ <b>Antigripal</b> Dosis anual</li> <li>+ <b>Triple viral (5)</b> Iniciar o completar esquema (K)</li> <li>+ <b>Triple Bacteriana Acelular (7)</b> Una dosis (M)</li> </ul>		

(1) Previene formas graves de tuberculosis.  
 (2) Previene meningitis, neumonía y sepsis por neumococo.  
 (3) DTP-HB-Hib: previene Difteria, Tétanos, Tos Convulsa, Hepatitis B, Haemophilus Influenzae b.  
 (4) Vacuna antipoliomielítica inactivada tipo Salk.  
 (5) Previene sarampión, rubéola y paperas.  
 (6) DTP previene difteria, tétanos y tos convulsa.  
 (7) DTP previene difteria, tétanos y tos convulsa.  
 (8) dT previene difteria y tétanos.  
 (9) VSR previene bronquiolitis y neumonía hasta los 6 meses de edad.

(A) Antes de egresar de la maternidad.  
 (B) En los primeros 12 horas de vida.  
 (C) Vacunación Universal. Si no hubiera recibido el esquema completo, deberá completarlo.  
 En caso de tener que iniciar: aplicar 1 dosis, 2º dosis al mes de la primera y 3º dosis a los seis meses de la primera.  
 (D) La 1º dosis debe administrarse antes de las catorce semanas y seis días o tres meses y medio de vida.  
 (E) La 2º dosis debe administrarse antes de las veinticuatro semanas o los seis meses de vida.  
 (F) Deberán recibir 2 dosis de la vacuna separadas al menos por cuatro semanas.  
 (G) Recomendada en adultos de 65 años o más.  
 (H) En cada embarazo deberán recibir la vacuna antigripal en cualquier trimestre de la gestación.  
 (I) Puérperas deberán recibir vacuna antigripal si no la hubiesen recibido durante el embarazo, antes del egreso de la maternidad y hasta un máximo de diez días después del parto.

(J) 2º dosis, en el año en que cumplen 5 años, para quienes nacieron en 2021, 2022, 2023 y en los primeros 6 meses de 2024.  
 (K) Si no hubiera recibido dos dosis de triple viral o una dosis de triple viral + 1 dosis de doble viral, después del año de vida para los nacidos después de 1965.  
 (L) Aplicar a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo independientemente del tiempo transcurrido desde la dosis previa.  
 (M) Personal de salud que asiste a menores de 12 meses. Revacunar cada 5 años.  
 (N) Varones y mujeres.  
 (O) Se aplica entre las semanas 32 y 36 del embarazo durante la temporada de circulación del VSR.  
 (P) Residentes en zonas de riesgo.  
 (Q) Residentes en zona de riesgo si la 1º dosis la recibió antes de los 2 años.  
 (R) Residentes y/o trabajadores con riesgo ocupacional en zona de riesgo y que no hayan recibido anteriormente la vacuna.

+ **Eclusivo zona de riesgo.**